









CIRCONIUM Zwischenfrucht in BESTER Kultur

			Besonders geeignet für Fruchtfolgen mit							Saatzeit-Empfehlung								Aussaatstärke	
CIRCONIUM-Mischungen	Zusammensetzung		Mais	Getreide	Raps	Zuckerrüben	Körner-leguminosen	Kartoffeln	Jul		Aug			Sep			Okt		kg/ha
									Anfang	Mitte	Ende	Anfang	Mitte	Ende	Anfang	Mitte	Ende	Anfang	
Mais-Getreide-Fruchtfolgen	CIRCONIUM Kornpro+N 	Örettich (Apoll, Siletina), Gelbsenf (Albatros, Cover, Pirat), Sommerwicke	XX	XX															30
	CIRCONIUM Waterprotect	Winterraps, Winterrüben, Markstammkohl	XX	XX															10 - 15
Raps-Fruchtfolgen	CIRCONIUM Multitalent	Phacelia, Rauhafer (Pratex), Ramtilkkraut, Öllein	XX	XX	XX		XX												20 - 25
	CIRCONIUM Kruziferenfrei 	Phacelia, Alexandrinerklee, Ramtilkkraut, Öllein	XX	XX	XX	X													10 - 18
Schmitt-nutzung	CIRCONIUM Klee gras 	Welsches Weidelgras (Barmultra II, Dolomit, Dorike) Inkarnatklee, Rotklee	XX	XX	X														30 - 40
	CIRCONIUM Winterfutter 	Bastard Weidelgras, Grünschnittroggen, Inkarnatklee, Rotklee	XX	XX	XX		XX												45 - 55
Kartoffel-Fruchtfolgen	CIRCONIUM Solapro+N 	Örettich (Doublemax - multiresistent) Rauhafer (Pratex) Sommerwicke	X	X		X		XX											50 - 55
Bodengesundheit / Stickstofffixierung	CIRCONIUM Nitropro 	Bitterlupine, Sommerwicke Alexandrinerklee Phacelia	XX	XX	XX														70 - 80
	CIRCONIUM Multicrop 	Phacelia, Rauhafer (Pratex), Leindotter, Örettich, Sorghum, Alexandrinerklee, Inkarnatklee, Peluschke, Winterwicke	XX	XX	X	X		X											25 - 35

 besondere Eignung für rote Gebiete (Leguminosen-Anteil)

Fruchtfolgeeignung:

XX = besonders gut geeignet
X = gut geeignet

Stand: April 2023

Düngung

Raps

Weizen

Gerste

Roggen/Triticale

Pflanzenschutz
Getreide

Zwischenfrüchte/
Grünland